



Knowledge grows

YaraVita® CROPLIFT®

YaraVita CROPLIFT är ett gödselmedel med N, P, K, S, Mg samt mikronäringsämnen för bladgödsling av en mängd olika grödor under perioder av stress eller snabb tillväxt.

En lättlöslig pulverformulering med en hög koncentration av näringsämnen. Är blandbar med nästan alla växtskyddsmedel. Absorberas snabbt av växterna och formuleringen säkerställer en långvarig effekt. Mycket skonsam för växten. Den höga koncentrationen ger en enkel hantering och mindre emballage.

Näringsinnehåll	g/kg
Kväve N	200
Fosfor P	39
Kalium K	128
Svavel S	5
Magnesium Mg	12
Bor B	0,5
Koppar Cu	2,5
Järn Fe	0,3
Mangan Mn	3
Zink Zn	1,6
Molybden Mo	0,1

Förvaring: Förvaras under torra och svala förhållanden
Förpackning: 10 kg säck

Rekommendationer

Spannmål:

2,5 till 5 kg/ha. Upprepa efter 10 till 14 dagar efter behov. Rekommenderas särskilt för att säkerställa tillförsel av näringsämnen under perioder av tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov (t.ex. i början av stråskjutningen) Vattenvolym: 200 l/ha.



Fördelar:

- Hög växtnäringskoncentration
- Heltäckande närings-sammansättning
- Snabbt upptag i växten
- Problemfri hantering





Knowledge grows

YaraVita® CROPLIFT®

Höst- och vårraps:

2,5 till 5 kg/ha. Upprepa efter 10 till 14 dagar efter behov. Rekommenderas särskilt för att säkerställa tillförsel av näringsämnen under perioder av tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov (t.ex. i början av plantsträckning). Vattenvolym: 200 l/ha.

Sockerbeter:

2,5 till 5 kg/ha. Upprepa med 10 till 14 dagars mellanrum efter behov. Vattenvolym: 200 l/ha.

Potatis:

Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandas i 200 liter vatten/ha. Upprepade behandlingar kan göras med intervaller på 10-14 dagar. Behandling kan utföras från att det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutvätskan. Behandlingar rekommenderas för att säkerställa tillräcklig växtnäringsstatus för plantorna under perioder med tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov.

Jordgubbar (friland):

2,5-5 kg/ha, blandas i 200 liter vatten/ha. Vid behov till alla jordbruksgrödor. Upprepade behandlingar kan göras med intervaller på 10-14 dagar. Behandling kan utföras från att det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutvätskan. Undvik behandling under blomning.

